



Stalltips:

FLUGBEKÄMPNING

Nuläge i besättningen:

Mål i besättningen:



Bekämpa fluglarver med bra stallhygien

Flugor är ett allvarligt insektsproblem i lantbruket. De har en enorm förmåga att föröka sig, en fluga kan ge upphov till 25 miljoner nya flugor under en säsong.

Flugor skapar inte bara irritation och stress hos djuren, utan sprider stora mängder bakterier. Därför är det viktigt att ha en fungerande flugbekämpning i gristallar.



Bekämpa flugor på larvstadiet

Flugans utveckling

Flughonan lägger sina ägg där det finns fukt, värme och mat. Därför är gödsel och foderrester vanliga platser för äggläggning. Äggen blir till larver efter ca ett dygn. Därefter passerar de tre larvstadier. De blir sedan puppa och till slut en flygande fluga. Hela processen tar ungefär två veckor under de varma sommarmånaderna.

BEKÄMPNING

När larverna väl är flugor så är de mycket svåra att bekämpa. Därför är förebyggande åtgärder den mest effektiva och ekonomiska metoden att minska förekomst av flugor. Genom att minimera kläckningsplatser blir flugorna färre.

- Ha en bra stall- och gödselhygien.
- Skrapa spalt och gödselgång ordentligt. Gör rent även i hörn, skarvar, under grindar och i krubbor.
- Se till att foderrester aldrig blir liggande.
- Laga läckande vattenkoppar och gör rent kring dessa.
- Spola spaltgolven med jämna mellanrum. Golven blir rena och larverna dränks.
- Spola utgödslingsanordningens kedjor, skenor och skrapor med högtryckstvätten då och då. Dessa är liksom gödselkulverten en gynnsam plats för fluglarver.
- Se över ventilationen. Flugor tycker inte om torr luft i rörelse.
- Täck om möjligt eventuell gödselstack med armerad plastpresenning. Detta höjer värmen i stacken och det tål inte flugorna.

