

KLÖVATLAS

Foto: Ulrika König, Malin Bengtsson, Åsa Hilmersson, Elin Dahllöv



NORMAL KLÖV

1. Klövspalthuden är torr och behårad. Klövens mjuka horn och hårda horn möts i axialfåran. Vita linjen är förbindelsen mellan sulans mjuka horn och ytterväggens hårda horn.

2. Abaxialfåran syns normalt sett inte så tydligt, men markerar övergången mellan mjukt och hårt horn på utsidan av klöven. Klövkapseln möter benets hud i kronranden.



KLÖVKLIPPNING

Spar några millimeter av klövväggen så att fåret inte bär sin tyngd på sulan och vita linjen.



KLÖVSPRICKOR

3. Horisontella sprickor kan vara en följd av fång.
4. Vertikala sprickor kan uppkomma av okänd anledning eller efter en klövböld.



KLÖVBÖLD

En klövböld som öppnat sig i kronranden.



VITA LINJEN-SEPARATION UTTALAD ABAXIALFÅRA

Vita linjen har separerat och en ficka har bildats innanför ytterväggen. Klöven har dessutom en tydlig uttalad abaxialfåra.



VITA LINJEN-SEPARATION

Vita linjen separation behöver klippas upp för att klöven ska växa normalt igen. Använd en rosensekatör och klipp upp fickbildningen.



BREDKLÖV

Bredklöv är en ärftlig defekt med onormalt breddad ytterklöv.

Skydda din besättning mot fotröta:

- Använd djurägarförsäkrans
- Undersök klövarna på inköpta djur
- Ställ inköpta djur i karantän i minst 3 veckor
- Ta in så få djur från så få besättningar som möjligt
- Fotbada inköpta djur före och efter karantänstiden i 10% zinksulfat

Tillhandahålls fn av Svenska Köttföretagen 010-130 89 32



HYPERPLASI

Hyperplasi är en utväxt i klövspalthuden.



KLÖVSPALTEKSEM

Klövspalthuden saknar behåring och irriterad av fukt och miljö.

Ser du förändringar som liknar fotröta
- kontakta Gård & Djurhälsan för bedömning och provtagning!



FOTRÖTA GRAD 2

Klövspalthuden är täckt av en smetig, vit beläggning med karaktäristisk lukt.



FOTRÖTA GRAD 3

Fotrötan har fortsatt från klövspalthuden ut i sulans mjuka horn.